

VESTIBULAR

UEM - Verão 2011

Prova 3 – Matemática


QUESTÕES OBJETIVAS

Nº DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

Nº DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- Confira os campos Nº DE ORDEM, Nº DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua carteira.
- Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.
- É proibido folhear o Caderno de Provas antes do sinal, às 9 horas.**
- Após o sinal, confira se este caderno contém 20 questões objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal.
- O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 horas após o início da resolução da prova.
- No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
- Transcreva as respostas deste caderno para a Folha de Respostas. A resposta correta será a soma dos números associados às proposições verdadeiras. Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 13, resposta 09 (soma das proposições 01 e 08).
- Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no Rascunho para Anotação das Respostas constante nesta prova e destaque-o, para retirá-lo hoje, nesta sala, no horário das 13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação do candidato. Após esse período, não haverá devolução.
- Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para Anotação das Respostas.



Corte na linha pontilhada.

RASCUNHO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS – PROVA 3 – VERÃO 2011

Nº DE ORDEM:

NOME:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Questão 01

É cada vez mais comum, em propagandas veiculadas em revistas e outras mídias, o uso de códigos QR. Um código QR é uma espécie de código de barras bidimensional, que é utilizado para armazenar informações diversas. Após codificada, a informação é armazenada sob a forma de um mosaico quadrado quadriculado formado por quadradinhos brancos e pretos, cuja dimensão (número de quadradinhos em cada linha e coluna) depende do tamanho da informação a ser armazenada. Levando-se em consideração as informações fornecidas e supondo que qualquer coloração dos quadrados do mosaico pelas cores preta ou branca forneça um código QR válido, e seus conhecimentos matemáticos, assinale o que for **correto**.

- 01) É possível construir exatamente 3200 códigos QR de dimensão 40×40 distintos.
- 02) O número de códigos QR de dimensão 17×17 que possuem os quatro quadradinhos dos quais um vértice é um vértice do mosaico, coloridos com a mesma cor (preta ou branca) corresponde exatamente a $1/8$ do total de mosaicos possíveis.
- 04) Se em um mosaico QR 10×10 , 70% dos quadradinhos são brancos e 30% são pretos, a probabilidade de, escolhendo-se ao acaso dois quadradinhos distintos, escolher dois da mesma cor é inferior a 70%.
- 08) Se as cores dos quadradinhos de dois mosaicos QR 10×10 coincidem em exatamente 40% dos quadradinhos e 60% dos quadradinhos cuja cor coincide em ambos os mosaicos possuem a cor branca, os quadradinhos pretos coincidentes em ambos os mosaicos representam 16% dos quadradinhos de um mosaico.
- 16) Só é possível construir, no máximo, dois mosaicos distintos, de mesma dimensão, de modo que quaisquer dois quadrados com um lado em comum possuam cores distintas.

Questão 02

Sejam A , B e C os vértices de um triângulo retângulo, sendo \hat{A} o ângulo reto e AC medindo o triplo de AB . Considerando agora os pontos D e E no segmento AC , de modo que $AD = DE = EC$, e F sendo o ponto médio do segmento BC , assinale o que for **correto**.

01) $\cos(\hat{B}) = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

02) Os triângulos BDC e FEC são congruentes.

04) $\text{sen}(\hat{BDC}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

08) Os triângulos EDF e BDF são semelhantes.

16) $\cos(\hat{EFC}) = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Questão 03

Considere as funções f e g , ambas com domínio e contradomínio real, dadas por $f(x) = 5x - \sqrt{2}$ e $g(x) = x^2 - 6x + 1$, para qualquer x real. A respeito dessas funções, assinale o que for **correto**.

01) A imagem de qualquer número racional, pela função f , é um número irracional.02) A função g possui uma única raiz real.04) Ambas as funções são crescentes no intervalo $[0, +\infty[$ do domínio.08) O gráfico da função $f \circ g$ é uma parábola.

16) Ambas as funções possuem inversas.

Rascunho

Em um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas xOy , considere uma circunferência λ_1 de centro $C(1,1)$ que contém a origem O do sistema de coordenadas e seja A o outro ponto de intersecção de λ_1 com o eixo Oy . Agora, considere um circunferência λ_2 com centro na origem O , cujo raio é o dobro do raio de λ_1 e sejam B e D os pontos de intersecção de λ_2 com o eixo Ox . Considerando que $\pi \cong 3,14$ e $\sqrt{2} \cong 1,41$ e as informações expostas, assinale o que for **correto**.

- 01) A área limitada pela circunferência λ_2 é o dobro da área limitada pela circunferência λ_1 .
- 02) As circunferências λ_1 e λ_2 são tangentes no ponto $E(2,2)$.
- 04) A área do triângulo ABD é maior do que a área limitada pela circunferência λ_1 .
- 08) A equação geral (ou normal) da circunferência λ_1 é $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$.
- 16) As áreas dos triângulos COB e COD são iguais.

Considere uma cidade com população atual de 350000 habitantes dos quais 10500 estão com suspeita de infecção pelo vírus da dengue. Esta cidade foi dividida em três regiões: região *A* com 80000 habitantes, região *B* com 130000 habitantes e região *C* com o restante dos habitantes. Considere, ainda, as seguintes informações: 20% da população da cidade já estiveram infectados pelo vírus da dengue; na região *B*, o índice de suspeitas de infecção é 10% superior à média da cidade. Baseando-se nessas informações, assinale o que for **correto**.

- 01) O número de pessoas da região *B* com suspeita de dengue é de, aproximadamente, 4% da população total da cidade.
- 02) O número total de casos suspeitos de dengue nas regiões *A* e *C* é de 6210.
- 04) A probabilidade de uma pessoa que já teve dengue estar no grupo dos suspeitos de infecção é menor ou igual a 15%.
- 08) Se a população da cidade aumenta 2% ao mês e a taxa de suspeitas de infecção permanece inalterada, então, daqui a três meses, o número de pessoas com suspeita de infecção será maior que 12000.
- 16) Se 15% da população da cidade é de crianças e 15% de pessoas têm mais de 50 anos, a probabilidade de uma pessoa desses dois grupos estar no grupo suspeito de infecção é de 10%.

Questão 06

Considere a seguinte função $f(x) = 4^{2x^2 - x - 1}$ cujo domínio é conjunto dos números reais. Com relação a essa função, assinale o que for **correto**.

- 01) O mínimo da função f ocorre em $x = 0$.
- 02) O conjunto solução da inequação $f(x) < 1$ é $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} < x < 1\}$.
- 04) Para $x = 0$, tem-se $\log_2 f(x) = -2$.
- 08) O conjunto solução da inequação $f(x) > 8$ é $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1 - \sqrt{21}}{4} \text{ ou } x > \frac{1 + \sqrt{21}}{4}\}$.
- 16) $\log_3 f(1)$ não existe.

Questão 07

Duas matrizes quadradas A e B , de mesma ordem, são semelhantes, se existir uma matriz C , possuindo a mesma ordem de A e B , de determinante não-nulo, tal que $A = C^{-1}BC$. Com relação a matrizes semelhantes, é **correto** afirmar que

- 01) matrizes com determinantes distintos podem ser semelhantes.
02) a matriz identidade de ordem $n \times n$ só é semelhante a si mesma.
04) se A é semelhante a B , então, necessariamente, A^2 é semelhante a B^2 .

08) se $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, então

$$C^{-1}BC = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 16) se A é semelhante a B , então, $2A$ é semelhante a $2B$.

Questão 08

João e Pedro decidiram treinar para competir na Corrida de São Silvestre, mas cada um está fazendo um treinamento diferente: João está correndo 40 minutos por dia e consegue percorrer uma distância de 6 km em cada dia; já Pedro está correndo 30 minutos por dia, do seguinte modo: no primeiro dia, ele percorreu uma distância de 3 km, no segundo dia percorreu 3,5 km, no terceiro dia percorreu 4 km, assim sucessivamente até o décimo quinto dia, e reinicia o processo percorrendo, novamente 3 km. Com essas informações, assinale o que for **correto**.

- 01) A sequência numérica formada pelas velocidades médias de Pedro, nos quinze primeiros dias de treinamento, forma uma progressão geométrica.
02) No quarto dia, a velocidade média que Pedro correu foi igual à velocidade média que João correu.
04) No décimo dia, Pedro percorreu a distância de 7,5 km.
08) A distância total percorrida por Pedro, desde o primeiro até o décimo terceiro dia, foi a mesma percorrida por João no mesmo período.
16) A diferença entre as distâncias totais percorridas por Pedro e João, nos quinze primeiros dias de treinamento, é maior que 10 km.

Rascunho

Questão 09

Uma empresa embala quatro tipos de produtos: A , B , C e D . Cada um desses produtos tem um prazo de validade diferente do outro, obedecendo às seguintes relações: o produto B tem um prazo de validade $\frac{1}{3}$ maior que o prazo de validade do produto C ; o prazo de validade do produto D é $\frac{7}{10}$ do prazo de validade do produto A ; o prazo de validade do produto C é $\frac{3}{5}$ do prazo de validade do produto A . Entenda-se como prazo de validade o número de dias entre a data na qual o produto foi embalado e a data máxima para a sua utilização. Com base nessas informações, assinale o que for **correto**.

- 01) Se o produto C tem prazo de validade de 60 dias, então o prazo de validade do produto A é de 100 dias.
- 02) O prazo de validade do produto D é menor que o prazo de validade do produto C .
- 04) O produto A é o que possui maior prazo de validade dentre os quatro produtos.
- 08) A soma dos prazos de validade dos produtos A e C é maior que soma dos prazos de validade dos produtos B e D .
- 16) Se o produto B tem prazo de validade de 80 dias, então o produto D tem prazo de validade de 75 dias.

Questão 10

Um determinado funil de plástico tem a forma de um tronco de cone cujas circunferências dos furos que o delimitam possuem raios 2 cm e 0,5 cm, e a altura do funil é de 6 cm. Considerando essas informações, e desprezando a espessura do funil, assinale o que for **correto**.

- 01) O volume (capacidade) do funil é maior do que 30 cm^3 .
- 02) A área lateral do funil é superior a 60 cm^2 .
- 04) Se o funil estiver em posição vertical, com o furo menor voltado para baixo e tampado, para encher o funil até metade da altura com água, serão necessários menos de 10 cm^3 de água.
- 08) Se o funil foi obtido de um cone, removendo-se sua ponta, a altura do cone original era de 10 cm.
- 16) A razão entre as áreas respectivas do círculo maior e menor que formam os furos do funil é igual a 8.

Questão 11

Considerando o seguinte polinômio $p(x) = (ax^2 + x + 2)(bx + c)$, em que a, b, c são números reais e $b \neq 0$ em relação à equação polinomial $p(x) = 0$, assinale o que for **correto**.

01) Se $c = 0$ e $a > \frac{1}{8}$, então a equação tem duas raízes não reais.

02) A equação tem pelo menos uma raiz real.

04) Se $a \leq 0$, então a equação terá todas as raízes reais.

08) Se $a = b = 1$, então as raízes da equação são:

$$x_1 = \frac{-1}{2} + \frac{i\sqrt{7}}{2}, x_2 = \frac{-1}{2} - \frac{i\sqrt{7}}{2} \text{ e } x_3 = -c.$$

16) Se $a = b = c = -1$, então a equação terá três raízes distintas.

Questão 12

Considere uma sala de aula composta por 48 alunos, sendo 21 meninos e 27 meninas. Na primeira prova de Matemática, 15 alunos da sala tiraram nota menor que 6, sendo 8 meninos, e, na primeira prova de Língua Portuguesa, 12 alunos tiraram nota menor que 6, sendo 6 meninas. Dentre esses que tiraram nota inferior a 6, houve ainda 3 alunos que ficaram com nota menor que 6 em ambas as disciplinas. De acordo com os dados fornecidos, assinale o que for **correto**.

01) A probabilidade de um menino ter tirado nota menor que 6 em ambas as disciplinas é de 25%.

02) Escolhido ao acaso um aluno (menino ou menina), a probabilidade de este ter tirado nota maior ou igual a 6, em ambas as disciplinas, é de 50%.

04) A probabilidade de um menino ter tirado nota maior ou igual a 6 em Matemática é $\frac{13}{21}$.

08) Se os 3 alunos que tiraram nota menor que 6 em ambas as disciplinas são meninos, então a probabilidade de uma menina ter tirado pelo menos uma nota maior ou igual a 6 é de 100%.

16) A probabilidade de uma menina ter tirado nota menor que 6 em Matemática é $\frac{8}{21}$.

Questão 13

Sobre uma circunferência com raio de 6 cm, marcam-se os pontos A , B e C , equidistantes entre si, e um ponto D diferente dos anteriores. Sobre essa situação, é **correto** afirmar que

- 01) a área do triângulo ABC supera metade da área do círculo delimitado pela circunferência na qual ele está inscrito.
- 02) o triângulo ABD possui, necessariamente, área menor do que a do triângulo ABC .
- 04) o triângulo ABC é isósceles.
- 08) se o triângulo ABD é isósceles seu maior lado é o lado AB .
- 16) a área da circunferência é menor do que 100 cm^2 .

Questão 14

Uma pirâmide $ABCDE$ possui base quadrada $ABCD$ e o vértice E é equidistante dos demais vértices. Seja O a interseção das diagonais do quadrado $ABCD$, assinale o que for **correto**.

- 01) Todas as faces triangulares dessa pirâmide são triângulos isósceles.
- 02) Se o comprimento do segmento OE é igual ao comprimento do segmento OA , todas as arestas da pirâmide possuem o mesmo comprimento.
- 04) Se o comprimento de OE é $\frac{\sqrt{15}}{2}$ vezes o comprimento do lado do quadrado $ABCD$, a área da face triangular ABE é maior do que a área de $ABCD$.
- 08) Se dobrar-se a medida do lado do quadrado e reduzir-se pela metade a medida da altura relativa à base quadrada, o volume da pirâmide permanecerá constante.
- 16) Se o volume da pirâmide, em centímetros cúbicos, é numericamente igual à área do quadrado $ABCD$, em centímetros quadrados, a altura da pirâmide é 3 cm.

Rascunho

Questão 15

Sabendo que r , s e t são três retas no espaço tridimensional com r e s paralelas distintas, assinale o que for **correto**.

- 01) Se a reta r é perpendicular a um plano α , então a reta s também é perpendicular ao plano α .
- 02) Se a reta t é concorrente com a reta s , então t também é concorrente com a reta r .
- 04) Se um plano β contém a reta s , então o plano β também contém a reta r .
- 08) Se a reta t é perpendicular à reta r , então t é perpendicular ou ortogonal à reta s .
- 16) Se as três retas r , s e t são paralelas distintas, então existe um plano α que contém as três retas.

Questão 16

Em um triângulo ABC , sejam t a medida do lado AB , u a medida do lado BC , v a medida do lado AC , e seja α a medida do ângulo $\hat{A}BC$, sabendo que $t \leq u \leq v$, assinale o que for **correto**.

- 01) Se $\frac{v}{u} = \frac{u}{t}$, então $u < 2t$.
- 02) A área do triângulo ABC é menor ou igual a $\frac{ut}{2}$.
- 04) Se M é o ponto médio do lado AB , e os triângulos AMC e BMC são congruentes, então ABC é um triângulo isósceles.
- 08) Se $\alpha = \pi/3$ rad, então $v^2 = (t+u)^2 + tu$.
- 16) Se $t+v=2u$ e ABC é acutângulo, então $u < \frac{4t}{3}$.

Rascunho

Questão 17

Em um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas xOy , considere três retas: r_1 a reta que contém os pontos $(2,0)$ e $(0,2)$; r_2 dada por sua equação na forma segmentária $\frac{x}{4} - \frac{y}{4} = 1$; e $r_3: \alpha x + y - 4 = 0$, em que α é algum número real. Em relação ao exposto, assinale o que for **correto**.

- 01) Se $\alpha = \frac{8}{3}$, então as três retas se interceptam em um mesmo ponto.
- 02) As retas r_1 e r_2 são perpendiculares.
- 04) Se $\alpha = 3$, então a área do triângulo formado pelas intersecções das retas, duas a duas, é $2 u.a.$.
- 08) Não existe número real α de modo que as retas r_2 e r_3 sejam paralelas.
- 16) Para $\alpha = 2$, o ângulo agudo entre as retas r_2 e r_3 é de 75° .

Questão 18

O lucro de uma empresa em um período de 15 meses foi modelado matematicamente por meio da seguinte função $f(x) = ax^2 + bx + c$, em que a variável x indica o mês e $f(x)$ o lucro, em milhões de reais, obtido no mês x . Sabe-se que no início desse período, digamos mês zero, a empresa tinha um lucro de 2 milhões de reais; no primeiro mês, o lucro foi de 3 milhões de reais; e, no décimo quinto mês, o lucro foi de 7 milhões de reais. Com base nessas informações, assinale o que for **correto**.

- 01) O lucro obtido no décimo quarto mês foi igual ao lucro obtido no oitavo mês.
- 02) O lucro máximo foi obtido no décimo mês.
- 04) O lucro máximo obtido foi superior a 7,5 milhões de reais.
- 08) O lucro da empresa nesse período de 15 meses oscilou de 2 a 7 milhões de reais.
- 16) O gráfico da função que modela o lucro é uma parábola com concavidade para baixo.

Rascunho

Questão 19

Um número natural é chamado quadrado perfeito, se ele for o quadrado de algum número natural. Sabendo disso, assinale o que for **correto**.

- 01) Existem quadrados perfeitos cuja diferença é 730.
- 02) Todo quadrado perfeito que é múltiplo de 7 é múltiplo de 49.
- 04) A multiplicação de um quadrado perfeito por outro quadrado perfeito é sempre um quadrado perfeito.
- 08) O resultado da soma de quadrados perfeitos é sempre um quadrado perfeito
- 16) 1025710 é um quadrado perfeito.


Questão 20

Considerando dois números complexos, $z = -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ na forma algébrica e $w = 3(\cos\theta + isen\theta)$ na forma trigonométrica, onde $0 \leq \theta < 2\pi$, assinale o que for **correto**.

- 01) $|z \cdot w \cdot \bar{z}| = |w|^3$.
- 02) Se $\theta = \frac{\pi}{3}$, então $\bar{w} = z$.
- 04) $z^4 = 27z$.
- 08) Se $\theta = \frac{\pi}{2}$, então $\left(\frac{z \cdot \bar{w}}{w}\right)^{10} = z^{10}$.
- 16) $|w^3 \cdot (\bar{z})^3 \cdot (\bar{w})^3 \cdot z^3| = |w|^9 \cdot |z|^9$.

Rascunho

MATEMÁTICA – Formulário

Trigonometria	$\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \sin(y)\cos(x)$ $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$ $\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg}(x) \pm \operatorname{tg}(y)}{1 \mp \operatorname{tg}(x)\operatorname{tg}(y)}$	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>Lei dos senos:</i></p> $\frac{a}{\sin(\hat{A})} = \frac{b}{\sin(\hat{B})} = \frac{c}{\sin(\hat{C})}$ <p><i>Lei dos cossenos:</i></p> $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\hat{A})$ </div> </div>
Análise Combinatória	$P_n = n!$ $A_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$	$C_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$ $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_{n,i} a^{n-i} b^i$
Geometria Plana e Espacial	<p>Comprimento da circunferência: $C = 2\pi R$</p> <p>Área do losango: $A = \frac{d D}{2}$</p> <p>Área do trapézio: $A = \frac{(b+B)h}{2}$</p> <p>Área do círculo: $A = \pi R^2$</p> <p>Área lateral do cilindro: $A = 2\pi R h$</p> <p>Área do setor circular: $A = \frac{R^2 \alpha}{2}$</p> <p>Área lateral do cone: $A = \pi R G$</p> <p>Área da superfície esférica: $A = 4\pi R^2$</p> <p>Área total do tetraedro regular: $A = \sqrt{3} a^2$</p>	<p>Volume do paralelepípedo: $V = B \cdot h$</p> <p>Volume do cubo: $V = a^3$</p> <p>Volume do prisma: $V = B \cdot h$</p> <p>Volume da pirâmide: $V = \frac{B \cdot h}{3}$</p> <p>Volume do cilindro: $V = \pi R^2 h$</p> <p>Volume do cone: $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$</p> <p>Volume da esfera: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$</p>
Progressões	<p>Progressão Aritmética (P. A.):</p> $a_n = a_1 + (n-1)r$ $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$	<p>Progressão Geométrica (P. G.):</p> $a_n = a_1 q^{n-1}$ $S_n = \frac{a_1 - a_1 q^n}{1 - q}, q \neq 1$ $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}, q < 1$
Geometria Analítica	<p>Ponto Médio do segmento de extremidades A(x_1, y_1) e B(x_2, y_2):</p> $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ <p>Área do triângulo de vértices P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2) e R(x_3, y_3):</p> $A = \frac{1}{2} D , \text{ onde } D = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$	<p>Distância de um ponto P(x_0, y_0) à reta r: $ax + by + c = 0$:</p> $d_{P,r} = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$
Conversão de unidades	$1 \text{ m}^3 = 1000 \ell$	